

## Elementy teorii mocy

### Równoliczność zbiorów

**Def. 1.** Mówimy, że zbiory  $X$  i  $Y$  są **równoliczne**, jeśli istnieje bijekcja  $f : X \rightarrow Y$ .  
O funkcji  $f$  mówimy wtedy, że ustala równoliczność zbiorów  $X$  i  $Y$ .

Dla równolicznych zbiorów  $X$  i  $Y$  stosujemy oznaczenie  $X \sim Y$ .

Istnienie bijekcji oznacza możliwość połączenia w pary elementów zbioru  $X$  z elementami zbioru  $Y$ .

**Uwaga:** Zbiory skończone są równoliczne, gdy mają tyle samo elementów.

**Wniosek:** Żaden podzbiór właściwy zbioru skończonego nie jest z nim równoliczny.

**Def. 2.** (Dedekind XIX w.) Mówimy, że **zbiór jest nieskończony**, jeśli jest równoliczny z pewnym swoim podzbiorem właściwym.

**Uwaga:** Jeżeli  $A$  jest zbiorem nieskończonym i  $A \subseteq B$ , to zbiór  $B$  też jest nieskończony.

### Przykłady zbiorów równolicznych

- $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$
- $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \sim \mathbb{R}$
- $(0; 1) = (0; 1]$ ,
- $2^X \sim \{0, 1\}^X$ , dla  $X \neq \emptyset$ .

### Własności równoliczności

**Tw. 1.** Dla dowolnych zbiorów  $X, Y, Z$  zachodzą własności:

1.  $X \sim X$ ,
2.  $X \sim Y \Rightarrow Y \sim X$ ,
3.  $X \sim Y \wedge Y \sim Z \Rightarrow X \sim Z$ .

Twierdzenie powyższe pozwala klasyfikować zbiory za pomocą relacji równoliczności i uogólnić pojęcie liczebności zbioru na zbiory nieskończone.

Każdemu zbiorowi  $X$  przypisuje się obiekt zwany **liczbą kardynalną** lub **mocą zbioru** (oznaczany  $|X|$  lub  $\overline{X}$ ) w taki sposób, że dwóm zbiorom przypisana jest ta sama liczba kardynalna wtedy i tylko wtedy, gdy są to zbiory równoliczne.

$$\overline{X} = \overline{Y} \Leftrightarrow X \sim Y$$

**Tw. 2.** Dla dowolnych zbiorów  $A, B, C, D$  zachodzą własności:

1.  $A \sim B \wedge C \sim D \Rightarrow A \times C \sim B \times D$ ,
2.  $A \sim B \wedge C \sim D \wedge A \cap C = \emptyset = B \cap D \Rightarrow A \cup C \sim B \cup D$ ,
3.  $A \sim B \Rightarrow 2^A \sim 2^B$ .

## Zbiory przeliczalne

**Def. 3.** Mówimy, że zbiór  $X$  jest **przeliczalny**, jeśli  $X \sim \mathbb{N}$ .

Zbiór nazywamy **co najwyżej przeliczalnym**, gdy jest skończony lub przeliczalny.

Moc zbioru przeliczalnego oznaczamy  $\aleph_0$  – alef zero ( $\aleph$  – pierwsza litera alfabetu hebrajskiego).

**Uwaga:** Zbiór jest przeliczalny, gdy z jego elementów można utworzyć ciąg nieskończony, w którym żaden wyraz się nie powtarza (elementy można ponumerować, tworząc nieskończoną listę).

**Uwaga:** Potęga zbioru przeliczalnego jest zbiorem co najwyżej przeliczalnym.

**Stw. 1.** Suma zbioru skończonego i przeliczalnego jest zbiorem przeliczalnym.

**Stw. 2.** Suma dwóch zbiorów przeliczalnych jest zbiorem przeliczalnym.

**Stw. 3.** Skonczona suma zbiorów przeliczalnych jest zbiorem przeliczalnym.

**Wniosek:** Zbiór liczb całkowitych jest przeliczalny, gdyż  $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n : \mathbb{N} \in \mathbb{N}\}$ .

**Stw. 4.** Iloczyn kartezjański dwóch zbiorów przeliczalnych jest zbiorem przeliczalnym.

**Stw. 5.** Iloczyn kartezjański skończonej liczby zbiorów przeliczalnych jest zbiorem przeliczalnym.

**Wniosek:** Zbiór  $\mathbb{Q}$  liczb wymiernych jest zbiorem przeliczalnym.

**Stw. 6.** Przeliczalna suma zbiorów przeliczalnych jest zbiorem przeliczalnym, czyli

$$\forall n \in \mathbb{N} A_n \sim \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \sim \mathbb{N}$$

Przykład 1. Zbiór wszystkich ciągów skończonych o wyrazach wymiernych jest przeliczalny.

Przykład 2. Zbiór  $\mathbb{Q}[x]$  wszystkich wielomianów o współczynnikach wymiernych jest przeliczalny.

Przykład 3. Zbiór wszystkich liczb algebraicznych jest przeliczalny.

**Liczy algebraiczne** to rzeczywiste pierwiastki wielomianów o współczynnikach wymiernych.

## Zbiory nieprzeliczalne

**Def. 4.** Zbiór nazywamy **nieprzeliczalnym**, jeśli jest nieskończony i nie jest zbiorem przeliczalnym.

**Uwaga:** Zbiór  $A$  jest nieprzeliczalny  $\Leftrightarrow$  nie można wszystkich jego elementów ustawić w ciąg, to znaczy żaden nieskończony ciąg o wyrazach z tego zbioru nie będzie zawierał wszystkich elementów tego zbioru. Istnieje taki  $a \in A$ , który nie jest wyrazem tego ciągu. Elementów zbioru nieprzeliczalnego nie da się ponumerować - nie można utworzyć z nich nieskończonej listy.

Przykład: zbiór liczb rzeczywistych z przedziału  $(0; 1)$  jest nieprzeliczalny.

**Stw. 7.** Zachodzą następujące fakty:

1. Jeżeli  $A$  - zbiór nieprzeliczalny i  $A \subseteq B$ , to  $B$  - nieprzeliczalny.
2. Jeżeli  $A$  - nieprzeliczalny i  $A \sim B$ , to  $B$  - nieprzeliczalny.
3. Jeżeli  $A \sim \mathbb{N}$  i  $A \subseteq B$  i  $B$  - nieprzeliczalny, to  $B \setminus A$  - nieprzeliczalny.

**Wnioski:**

1. Zbiór liczb rzeczywistych  $\mathbb{R}$  jest nieprzeliczalny.
2. Każdy przedział zawarty w  $\mathbb{R}$  jest nieprzeliczalny.
3. Zbiór liczb niewymiernych jest nieprzeliczalny.
4. Zbiór liczb przestępnych jest nieprzeliczalny.

Zbiór **liczb przestępnych** to dopełnienie zbioru liczb algebraicznych w  $\mathbb{R}$ .

**Uwaga:** Moc zbioru  $\mathbb{R}$  nazywamy **continuum** i oznaczamy gotycką literą  $\mathfrak{c}$ .

Zachodzi  $\mathfrak{c} \neq \aleph_0$ , ponieważ  $\mathbb{R} \approx \mathbb{N}$ .

## Porównywanie mocy zbiorów

Niech  $X, Y$  - zbiory,  $\overline{X} = \mathfrak{n}$ ,  $\overline{Y} = \mathfrak{m}$ .

**Def. 5.** Mówimy, że liczba kardynalna  $\mathfrak{n}$  jest nie większa od liczby kardynalnej  $\mathfrak{m}$  ( $\mathfrak{n} \leq \mathfrak{m}$ ), gdy zbiór  $X$  jest równoliczny z pewnym podzbiorem zbioru  $Y$ . Gdy  $\mathfrak{n} \leq \mathfrak{m}$  i  $\mathfrak{n} \neq \mathfrak{m}$ , to mówimy, że  $\mathfrak{n}$  jest mniejsza od liczby kardynalnej  $\mathfrak{m}$  ( $\mathfrak{n} < \mathfrak{m}$ ).

**Uwaga:** Jeśli  $X \subseteq Y$ , to  $\overline{X} \leq \overline{Y}$ .

**Wniosek:**  $\aleph_0 \leq \mathfrak{c}$  i  $\aleph_0 \neq \mathfrak{c}$ , więc  $\aleph_0 < \mathfrak{c}$  (bo  $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$  i  $\mathbb{N} \neq \mathbb{R}$ ).

**Tw. 3.** Dla dowolnych niepustych zbiorów  $X$  i  $Y$  następujące warunki są równoważne:

1.  $\overline{\overline{X}} \leq \overline{\overline{Y}}$ ;
2. istnieje funkcja różnowartościowa  $f : X \rightarrow Y$ ;
3. istnieje funkcja "na"  $g : Y \rightarrow X$

**Stw. 8.** Jeśli  $\overline{\overline{X}} = \mathfrak{c}$ ,  $\overline{\overline{Y}} = \aleph_0$  i  $Y \subseteq X$ , to  $\overline{\overline{X \setminus Y}} = \mathfrak{c}$ .

**Tw. 4.** Dla dowolnych liczb kardynalnych  $\mathfrak{n}, \mathfrak{m}, \mathfrak{p}$  zachodzą własności:

1.  $\mathfrak{n} \leq \mathfrak{n}$ ;
2.  $\mathfrak{n} \leq \mathfrak{m}$  i  $\mathfrak{m} \leq \mathfrak{p}$ , to  $\mathfrak{n} \leq \mathfrak{p}$ ;
3.  $\mathfrak{n} \leq \mathfrak{m}$  i  $\mathfrak{m} \leq \mathfrak{n}$ , to  $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}$ .

**Uwaga:** Własność 3. znana jest jako Tw. Cantora-Bernsteina.

Równoważne sformułowanie:  $X \subseteq Y \subseteq Z$  i  $\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Z}}$ , to  $\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Y}} = \overline{\overline{Z}}$ .

Twierdzenie to pozwala znacznie uprościć dowody równoliczności zbiorów.

**Tw. 5.** Jeśli  $\mathfrak{n}, \mathfrak{m}$  – liczby kardynalne, to  $\mathfrak{n} \leq \mathfrak{m}$  lub  $\mathfrak{m} \leq \mathfrak{n}$ , czyli dowolne liczby kardynalne są porównywalne.

**Tw. 6.** (Cantora) Dla dowolnego zbioru  $X$  prawdziwa jest nierówność

$$\overline{\overline{X}} < \overline{\overline{2^X}}$$

Przykład: Zbiór wszystkich funkcji  $f : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$  ma moc większą niż  $\mathfrak{c}$ .

**Wniosek:** Istnieje nieskończenie wiele liczb kardynalnych większych od  $\aleph_0$ .

$$\aleph_0 = \overline{\overline{\aleph_0}} < \overline{\overline{2^{\aleph_0}}} < \overline{\overline{2^{2^{\aleph_0}}}} < \dots$$

**Wniosek:** Nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów.

## Arytmetyka liczb kardynalnych

### Dodawanie

Niech  $\mathfrak{n} = \overline{\overline{X}}$ ,  $\mathfrak{m} = \overline{\overline{Y}}$  i  $X \cap Y = \emptyset$ , wtedy  $\mathfrak{n} + \mathfrak{m} = \overline{\overline{X \cup Y}}$ .

Działanie dodawania liczb kardynalnych jest poprawnie określone, gdyż prawdziwe jest następujące twierdzenie:

**Tw. 7.** Jeśli  $\overline{\overline{X_1}} = \overline{\overline{X}}$ ,  $\overline{\overline{Y_1}} = \overline{\overline{Y}}$ ,  $X \cap Y = \emptyset$ ,  $X_1 \cap Y_1 = \emptyset$ , to  $\overline{\overline{X \cup Y}} = \overline{\overline{X_1 \cup Y_1}}$ .

Przykład:  $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0 + n = \aleph_0$  dla dowolnego  $n \in \mathbb{N}$ .

### Własności dodawania liczb kardynalnych

1.  $n + m = m + n$  przemienność ( $X \cup Y \sim Y \cup X$ )
2.  $n + (m + p) = (n + m) + p$  łączność  $X \cup (Y \cup Z) \sim (X \cup Y) \cup Z$
3. Jeśli  $n \leq m$ , to  $n + p \leq m + p$  monotoniczność
4. Jeśli  $n \geq \aleph_0$  lub  $m \geq \aleph_0$ , to  $n + m = \max\{m, n\}$ .

**Wniosek:**  $c + n = c + \aleph_0 = c + c = c$ .

### Mnożenie

Niech  $n = \overline{X}$ ,  $m = \overline{Y}$ , wtedy  $n \cdot m = \overline{X \times Y}$ .

Działanie mnożenia liczb kardynalnych jest poprawnie określone, gdyż prawdziwe jest następujące twierdzenie:

**Tw. 8.** Jeśli  $\overline{X_1} = \overline{X}$ ,  $\overline{Y_1} = \overline{Y}$ , to  $\overline{X \times Y} = \overline{X_1 \times Y_1}$ .

### Własności mnożenia liczb kardynalnych

1.  $n \cdot m = m \cdot n$  przemienność ( $X \times Y \sim Y \times X$ )
2.  $n \cdot (m \cdot p) = (n \cdot m) \cdot p$  łączność  $X \times (Y \times Z) \sim (X \times Y) \times Z$
3.  $n \cdot (m + p) = n \cdot m + n \cdot p$  rozdzielność mnożenia względem dodawania  
 $X \times (Y \cup Z) \sim (X \times Y) \cup (X \times Z)$
4. Jeśli  $n \leq m$ , to  $n \cdot p \leq m \cdot p$  monotoniczność
5. Jeśli  $n \in \mathbb{N}$ , to  $n \cdot m = m + m + \dots + m$  ( $n$  składników)
6. Jeśli  $n \geq \aleph_0$  lub  $m \geq \aleph_0$ , to  $n \cdot m = \max\{m, n\}$ .

**Wniosek:**  $n \cdot c = \aleph_0 \cdot c = c \cdot c = c$ .

Przykład: Kwadrat  $[0; 1] \times [0; 1]$  jest zbiorem mocy continuum.

**Wniosek:**  $\overline{\mathbb{R}^2} = c$ .

Przykład: Zbiór wszystkich nieskończonych ciągów o wyrazach 0 lub 1 jest równoliczny z przedziałem  $[0; 1]$ .

**Wniosek:**  $\overline{\{0, 1\}^{\mathbb{N}}} = \overline{2^{\mathbb{N}}} = c = \overline{\mathbb{R}}$ .

## Potęgowanie liczb kardynalnych

Niech  $n = \overline{X}$ ,  $m = \overline{Y}$ , wtedy  $n^m = \overline{X^Y} = \overline{\{f : Y \rightarrow X\}}$ .

Działanie potęgowania liczb kardynalnych jest poprawnie określone, gdyż prawdziwe jest następujące twierdzenie:

**Tw. 9.** *Jeśli  $\overline{X_1} = \overline{X}$ ,  $\overline{Y_1} = \overline{Y}$ , to  $\overline{X_1^{Y_1}} = \overline{X^Y}$ .*

Wniosek:  $2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$

### Własności potęgowania liczb kardynalnych

1.  $n^{m+p} = n^m \cdot n^p$      $X^{Y \cup Z} \sim X^Y \times X^Z$
2.  $(n \cdot m)^p = n^p \cdot m^p$      $(X \times Y)^Z \sim X^Z \times Y^Z$
3.  $(n^m)^p = n^{m \cdot p}$      $(X^Y)^Z \sim X^{Y \times Z}$
4. Jeśli  $n \leq m$ , to  $n^p \leq m^p$
5. Jeśli  $n \leq m$ , to  $p^n \leq p^m$

Przykład:  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$

Zbiór wszystkich nieskończonych ciągów o wyrazach naturalnych jest mocy continuum.

## Hipoteza continuum

*Czy istnieje zbiór nieprzeliczalny mocy mniejszej niż continuum?*

Gdyby taki zbiór nie istniał, to każdy podzbiór zbioru  $\mathbb{R}$  byłby co najwyżej przeliczalny albo miał moc continuum. Hipotezę, że tak właśnie jest, czyli że **każdy nieprzeliczalny podzbiór zbioru liczb rzeczywistych ma moc continuum** sformułował Georg Cantor i nazwał ją **hipotezą continuum**.

Inaczej można sformułować tę hipotezę następująco:

*Nie istnieje liczba kardynalna większa niż  $\aleph_0$  i jednocześnie mniejsza niż  $\mathfrak{c}$ .*

Nie udało się tej hipotezy udowodnić ani obalić. Wykazano, że na gruncie powszechnie przyjętej formalizacji matematyki (aksjomaty teorii mnogości ZFC) **nie da się odpowiedzieć** na postawione powyżej pytanie.

## Hierarchia alefów

**Tw. 10.** Dla każdej liczby kardynalnej  $\mathfrak{m}$  istnieje jej następnik  $\mathfrak{m}^+$ , czyli najmniejsza liczba kardynalna od niej większa.

$\aleph_0$  – najmniejsza nieskończona liczba kardynalna;

$\aleph_1 = \aleph_0^+$  – następna liczba kardynalna po  $\aleph_0$ ;

$\aleph_2 = \aleph_1^+$  – następnik liczby  $\aleph_1$ ;

...

$\aleph_1$  to najmniejsza nieprzeliczalna liczba kardynalna.

Hipoteza continuum:  $\aleph_1 = \mathfrak{c}$

## Uogólniona hipoteza continuum

Generalna hipoteza continuum – **GCH**, to przypuszczenie, że dla każdej nieskończonej liczby kardynalnej  $\mathfrak{m}$  zachodzi równość:

$$2^{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}^+.$$

**ZFC** to powszechnie uznany system aksjomatów teorii mnogości Zermelo-Fraenkla z aksjomatem wyboru.

W 1938 r. austriacki matematyk Kurt Gödel udowodnił, że bazując na systemie aksjomatów ZFC nie da się obalić generalnej hipotezy continuum, czyli że założenie prawdziwości tej hipotezy nie prowadzi do sprzeczności z aksjomatami teorii mnogości. Oznacza to, że GCH jest niesprzeczna z aksjomatami ZFC.

W 1963 r. amerykański matematyk Paul Cohen udowodnił, że opierając się na systemie ZFC, nie można udowodnić hipotezy continuum (dokładnie, że negacja tej hipotezy jest niesprzeczna z aksjomatami ZFC). Razem z twierdzeniem Gödla oznacza to, że **hipoteza continuum jest niezależna od aksjomatów ZFC**. Jest ona zdaniem nierozstrzygalnym teorii mnogości.